

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

Kontrollant: _____ Internt nummer: _____

OBS: Journaliseres på kampagnesagen 2014-13-60-00072

Ejer/Ansæt: _____ Antal år i smådyrpraksis: _____ Fagdyrlæge m.m.: _____

Antal hunde-konsultationer/måned: _____

Antal katte-konsultationer/måned: _____

A. ANTIBIOTIKAPOLITIK

Har praksis en antibiotikapolitik (ja/nej): _____

Hvis nej: Har du en antibiotikapolitik(ja/nej)? _____

a) Principper for antibiotikapolitik: _____

(Hvad er I gode til?) _____

b) Diagnostik og resistensbestemmelse:

Hund: Hvor ofte udføres resistensbestemmelse pr. måned, hund? _____

Ved hvilke lidelser? _____

Hvilket laboratorium benyttes? _____

Kat: Hvor ofte udføres resistensbestemmelse pr. måned, kat? _____

Ved hvilke lidelser _____

Hvilket laboratorium benyttes? _____

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014


c) Antibiotikavalg

Kender du antibiotikavejledningen?: _____

Bruger du den? _____


Har I lavet praksistilpasninger? _____

HUND: Valg af antibiotika (ATC-grupper), rutinemæssige behandlinger:



INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

KAT: Valg af antibiotika (ATC-grupper), rutinemæssige behandlinger:



Lidelse	Antal tilfælde pr. måned	Præparat (start)	Evt. præparat (efterbehandling)	Varighed (efterbehandling)
Bid/bylder				
Urinvejsinfektion				

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

d) Forebyggende antibiotisk behandling i forbindelse med operation

HUND

Operation	Antal op. pr. måned	Hvor ofte antibiotika? x ud af 10 operationer	Præparat (start), Navn, dosis	Præparat (efterbehandling) (Navn, adm.vej og dosis*)	Varighed (efterbehandling)
Kastration		_____ ud af 10			
Sterilisation		_____ ud af 10			
Tandrensning		_____ ud af 10			
		_____ ud af 10			

* kan besvares med standardbehandling. Obs. Hvordan er det defineret af dyrlægen?

KAT

Operation	Antal op. pr. måned	Hvor ofte antibiotika? x ud af 10 operationer	Præparat (start), Navn, dosis	Præparat (efterbehandling) (Navn, adm.vej og dosis*)	Varighed (efterbehandling)
Kastration		_____ ud af 10			
Sterilisation		_____ ud af 10			
Tandrensning		_____ ud af 10			
		_____ ud af 10			

* kan besvares med standardbehandling. Obs. Hvordan er det defineret af dyrlægen?

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

B KRITISK VIGTIGE ANTIBIOTIKA

Fluorokinoloner og 3. og 4. generations cephalosporiner

Hvor hyppigt anvender du?	Aldrig	Dagl.	Ugentl.	Månedligt	Halvårligt	Mindre	Lidelser	Resistensbestemmelse X gange ud af 10	Prioritet (valg nr.)
TIL HUND									
Convenia ®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Aurizon ® øresalve	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Baytril ® injektion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Baytril ® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Floxabactin Vet tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marbocyl ® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Softiflox Vet tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Xeden ® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Verafloxabactam tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

TIL KAT									
Convenia ®	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Baytril ® injektion	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Baytril ® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Marbocyl ® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Softiflox Vet tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Xeden® tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Verafloxabactam oral opl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
Verafloxabactam tabl.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

*andre til dyrearten ikke registrerede fluorokinoloner og 3. og 4. gen. Cephalosporiner)

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

OVERSIGT KRITISKE ANTIBIOTIKA TIL HUND

Præparat	Stofgruppe	Indikation	Styrke
Convenia ®	3. og 4. gen.Cep Cefovecin	Til de følgende indikationer, der kræver langtidsbehandling. Hund: Til behandling af hud- og bindevævsinfektioner inkl. pyodermi, sår og abscesser forårsaget af Staphylococcus intermedius, beta-haemolytiske streptococci, Escherichia coli og/eller Pasteurella multocida. Til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli og Proteus spp. Til adjunktiv behandling ved mekanisk eller operativ periodontal behandling af alvorlige infektioner i tandkødet og i det parodontale væv forårsaget af Porphyromonas spp. og Prevotella spp.	Inj. 80 mg/ml
Aurizon ® øresalve	3. gen.Cep	Behandling af otitis externa forårsaget af bakterier og svampe hos hund. Brugen bør baseres på en følsomhedstest.	Øredråber 1x10 ml.
Baytril ® injektion	FQ Enrofloxacin	Infektioner forårsaget af enrofloxacin-følsomme bakterier/mykoplasmer hos kalve, ungkreaturer, svin, fjerkræ samt udvoksede <u>hunde</u> og katte. Luftvejsinfektioner, enteritis, urinvejsinfektioner, dermatitis samt infektioner i reproduktionssystemet.	Inj. 50mg/ml 100 mg/ml
Baytril ® tabl.	FQ Enrofloxacin	Do	Tabl. 50 mg 150 mg
Floxabactin vet tabletter	FQ Enrofloxacin	Behandling af infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbindelse til prostatitis) og infektioner i den øvre urinvej forårsaget af Escherichia coli eller Proteus mirabilis. Behandling af overfladisk og dyb pyoderma	Tabl. 15 mg 50 mg 150 mg
Marbocyl ® tabl.	FQ Marbofloxacin	Infektioner i hud og bløddele hos hund og kat forårsaget af mikroorganismer følsomme for marbofloxacin. Infektioner i urinvejene hos hund forårsaget af mikroorganismer følsomme for marbofloxacin. Brugen bør baseres på en følsomhedstest.	Tabl. 5 mg 20 mg 80 mg
Softiflox Vet tabl.	FQ Marbofloxacin	Behandling af infektioner i hud og bløddele (hudfoldspyoderma, impetigo, folliculitis, furunkulose, cellulitis) forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer, urinvejsinfektioner evt. i forbindelse med prostatitis forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer samt respirationsvejsinfektioner forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer	Tabl. 5 mg 20 mg 80 mg
Xeden ® tabletter	FQ Enrofloxacin	Infektioner i den nedre urinvej (med og uden forbindelse til prostatitis) og infektioner i den øvre urinvej forårsaget af Escherichia coli eller Proteus mirabilis. Behandling af overfladisk og dyb pyoderma	Tabl. 15 mg 50 mg 200 mg
Veraflox tabl.	FQ Pradafloxacin	Behandling af: - Sårinfektioner forårsaget af følsomme stammer af Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius). - Overfladiske og dybe pyodermier forårsaget af følsomme stammer af Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius). - Akutte urinvejsinfektioner forårsaget af følsomme stammer af Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius). - Som tillægsbehandling til mekanisk eller kirurgisk periodontal behandling af svære infektioner i tandkød og det periodontale væv forårsaget af følsomme stammer af anaerobe organismer, f.eks. Porphyromonas spp. og Prevotella spp.	Tabl. 15 mg 60 mg

INTERVIEW SMÅDYRSDYRLÆGER 2014

OVERSIGT KRITISKE ANTIBIOTIKA TIL KAT

Præparat	Stofgruppe	Indikation	Styrke
Convenia ®	3. og 4. gen.Cep Cefovecin	Til behandling af abscesser og sår i hud og bindevæv forårsaget af Pasteurella multocida, Fusobacterium spp., Bacteroides spp., Prevotella oralis, beta-haemolytiske streptococcer og /eller Staphylococcus intermedius. Til behandling af urinvejsinfektioner forårsaget af Escherichia coli.	Inj. 80 mg/ml
Baytril ® injektion	FQ Enrofloxacin	Infektioner forårsaget af enrofloxacin-følsomme bakterier/mykoplasmer hos kalve, ungkreaturer, svin, fjerkræ samt udvoksede hunde og <u>katte</u> . Luftvejsinfektioner, enteritis, urinvejsinfektioner, dermatitis samt infektioner i reproduktionssystemet.	Inj. 50mg/ml 100 mg/ml
Baytril ® tabl.	FQ Enrofloxacin	do	Tabl. 50 mg
Floxabactin vet tabletter	FQ Enrofloxacin	Behandling af infektioner i de øvre luftveje.	Tabl. 15 mg
Marbocyl ® tabl.	FQ Marbofloxacin	Infektioner i hud og bløddele hos hund og kat forårsaget af mikroorganismer følsomme for marbofloxacin. Brugen bør baseres på en følsomhedstest.	Tabl. 5mg 20 mg
Softiflox Vet tabl.	FQ Marbofloxacin	Behandling af infektioner i hud og bløddele (sår, abscesser, flegmoner) og øvre respirationsvejsinfektioner forårsaget af følsomme stammer af mikroorganismer.	Tabl. 5 mg
Xeden® tabletter	FQ Enrofloxacin	Bakterieinfektioner i de øvre luftveje.	Tabl. 15 mg 50 mg
Veraflox tabl.	FQ Pradafloxacin	Behandling af: - Akutte infektioner i de øvre luftveje forårsaget af følsomme stammer af Pasteurella multocida, Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius).	Tabl. 15 mg
Veraflox oral susp.	FQ Pradafloxacin	Til behandling af akutte infektioner i de øvre luftveje forårsaget af pradofloxacin-følsomme stammer af Pasteurella multocida, Escherichia coli og Staphylococcus intermedius-gruppen (inkl. S. pseudintermedius) samt sårinfektioner og abscesser forårsaget af pradofloxacin-følsomme stammer af Pasteurella multocida og Staphylococcus intermedius-gruppen (incl. S. pseudintermedius) hos kat.	Oral opløsning 25 mg/ml